

BE Aquilae ($19^h 14^m 7^s - 7^\circ 1'2$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von $13^m 8 - [15^m 4$. Swope leitet aus 64 Beobachtungen, die sich über 49 Epochen verteilen, die Elemente ab: $2414780 + 214^d 2 \cdot E$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809]. — **Payne**, Elemente von Swope [HB 861].

BF Aquilae ($19^h 15^m 2^s - 6^\circ 38'7$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von $14^m 5 - [16^m 5$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

BG Aquilae ($19^h 15^m 24^s - 5^\circ 4'1$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von $15^m 0 - [16^m 5$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

BH Aquilae ($19^h 15^m 57^s - 6^\circ 58'0$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von $15^m 0 - 16^m 1$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

BI Aquilae ($19^h 16^m 46^s - 8^\circ 34'6$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von $13^m 5 - 16^m 4$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

BK Aquilae ($19^h 17^m 33^s - 8^\circ 55'8$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 auf Harvard-Platten von Woods als veränderlich von $14^m 5 - 16^m 4$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

BL Aquilae ($19^h 18^m 33^s - 9^\circ 25'4$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 auf Harvard-Platten von Woods als veränderlich von $14^m 8 - [16^m 5$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

BM Aquilae ($19^h 19^m 48^s - 7^\circ 46'4$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von $13^m 7 - [15^m 3$. Swope leitet aus 73 Beobachtungen, die sich über 45 Epochen verteilen, die Elemente ab: $\text{Max.} = 2415562 + 236^d 7 \cdot E$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809]. — **Payne**, Elemente von Swope [HB 861].

BN Aquilae ($19^h 19^m 59^s - 1^\circ 22'8$). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 auf Harvard-Platten von Woods als veränderlich von $15^m 5 - 16^m 5$.

LITERATUR: **Shapley**, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].