

**BW Aquilae** ( $19^{\text{h}} 28^{\text{m}} 30^{\text{s}} - 8^{\circ} 14'.3$ ). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 auf Harvard-Platten von Cannon, die  $\delta$  Cephei-Typus vermutet. Amplitude  $16^{\text{m}}0 - 16^{\text{m}}5$ .

LITERATUR: Cannon, Entdeckung [HC 265].

**BX Aquilae** ( $19^{\text{h}} 28^{\text{m}} 50^{\text{s}} - 2^{\circ} 11'.7$ ). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von  $14^{\text{m}}4 - 16^{\text{m}}4$ .

LITERATUR: Shapley, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

**BY Aquilae** ( $19^{\text{h}} 30^{\text{m}} 5^{\text{s}} - 8^{\circ} 54'.0$ ). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von  $15^{\text{m}}5 - [16^{\text{m}}4$ .

LITERATUR: Shapley, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

**BZ Aquilae** ( $19^{\text{h}} 30^{\text{m}} 18^{\text{s}} - 1^{\circ} 57'.5$ ). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von  $15^{\text{m}}0 - 16^{\text{m}}6$ .

LITERATUR: Shapley, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

**CC Aquilae** ( $19^{\text{h}} 31^{\text{m}} 39^{\text{s}} - 1^{\circ} 16'.1$ ). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von  $16^{\text{m}}1 - [16^{\text{m}}5$ .

LITERATUR: Shapley, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

**CD Aquilae** ( $19^{\text{h}} 32^{\text{m}} 58^{\text{s}} - 4^{\circ} 32'.5$ ). Nicht in BD.

[BD -  $4^{\circ} 48'66$  *ssp*  $5'.5$  \*  $14^{\text{m}}5$  *nnf*  $1'.0$  \*  $15^{\text{m}}$  *nj*  $1'.6$ .]

Ort bestimmt von Reinmuth (AN 5709).

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von  $12^{\text{m}}8 - 16^{\text{m}}5$ . Die Veränderlichkeit wird durch 9 Beobachtungen Reinmuths bestätigt.

LITERATUR: Shapley, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809]. — Reinmuth, 9 Beob. [AN 5709].

**CE Aquilae** ( $19^{\text{h}} 35^{\text{m}} 11^{\text{s}} - 1^{\circ} 48'.5$ ). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 von Woods auf Harvard-Platten als veränderlich von  $15^{\text{m}}6 - 16^{\text{m}}4$ . Der Stern wurde 1928 von Ross neu gefunden.

LITERATUR: Shapley, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809]. — Ross, Entdeckung [AJ 903].

**CF Aquilae** ( $19^{\text{h}} 35^{\text{m}} 11^{\text{s}} - 2^{\circ} 6'.2$ ). Nicht in BD.

Entdeckt 1924 auf Harvard-Platten von Woods als veränderlich von  $14^{\text{m}}0 - [16^{\text{m}}5$ .

LITERATUR: Shapley, Anzeige der Entdeckung durch Woods [HB 809].

**CG Aquilae** ( $19^{\text{h}} 36^{\text{m}} 9^{\text{s}} - 3^{\circ} 36'.2$ ). Nicht in BD.

[\*  $13^{\text{m}}$  *nnp*  $0'.7$  \*  $15^{\text{m}}$  *sf*  $1'.0$  \*  $12^{\text{m}}$  *nnp*  $2'.5$ .]

Ort bestimmt von Reinmuth (AN 5709).